



MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

-----  
SECRETARIAT GÉNÉRAL

-----  
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ

-----  
DIRECTION DE LA VEILLE SANITAIRE ET DE LA SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE

# FICHE DE DECLARATION HEBDOMADAIRE

POUR LES AGENTS DE SANTE  
(dans les formations sanitaires)



<b>DEFINITIONS DE CAS</b>	
<b>Alerte</b>	Toute maladie ou évènement inhabituel
<b>Catastrophe</b>	Un évènement soudain, désastreux qui perturbe gravement le fonctionnement d'une communauté ou d'une société et cause des pertes humaines, matérielles, et économique ou environnementales, dépassant les capacités de la communauté à faire face à l'aide de ses propres ressources.
<b>Risque sanitaire</b>	Un risque sanitaire désigne un risque, immédiat ou à long terme, plus ou moins probable auquel la santé publique est exposée.
<b>Prérupture ou rupture ou d'intrants</b>	Prérupture : le niveau de stock en intrants est en dessous du stock minimal de réserve Rupture : absence d'intrants
<b>Cas de fièvre (T ≥ 37,5°C)</b>	Toute personne (tout âge confondu) présentant une température T ≥ 37,5°C
<b>Nombre total de cas de Diarrhée</b>	Emission d'au moins 3 selles molles ou liquides par jour depuis moins de 15 jours, avec ou sans signes de déshydratation chez tout âge confondu
<b>Diarrhée aqueuse aiguë chez &gt; 5 ans</b>	Emission d'au moins 3 selles molles ou liquides par jour depuis moins de 15 jours, avec ou sans signes de déshydratation chez toute personne âgée de plus de 5ans
<b>Dysenterie et diarrhée sanglante</b>	Toute personne souffrant de diarrhée (apparue depuis moins de 15 jours) avec présence de sang visible dans les selles, associée ou non à des glaires ou des douleurs abdominales, avec ou sans signes de déshydratation
<b>Hématurie (suspicion bilharziose intestinale)</b>	Présence de sang dans les urines
<b>Syndrome grippal</b>	Toute personne (tout âge) présentant Fièvre d'apparition brusque avec une température supérieure ou égale à 37°5 associé à une toux OU maux de gorge avec apparition des symptômes dans les 3 jours ET ne nécessitant pas d'hospitalisation.
<b>Suspicion de Filariose lymphatique</b>	Toute personne présentant un ou plusieurs symptômes aigus : fièvre et enflure localisée, lymphangite (augmentation de volume des membres ou de la bourse)
<b>Cas de tungose ou de puce chique</b>	Coloration ronde blanchâtre sous la peau avec petite tache noir au milieu très prurigineuse et ou douloureuse qui se situe le plus souvent au niveau des orteils ou des doigts
<b>Suspicion de neurocysticercose</b>	Céphalées intenses rebelles aux antalgiques usuelles, crises convulsives apyrétique, vertige et/ou syncope à répétition, troubles visuels avec scotomes
<b>IRA</b>	Toux avec rhume et augmentation de la fréquence respiratoire et fièvre

<b>Episode d'Intoxication collective due aux animaux marins (ICAM)</b>	Survenue de symptômes cliniques variés au décours de la consommation d'un animal marin, touchant habituellement au moins 02 personnes ayant consommé cet animal.
<b>Episode de Toxi Infection Alimentaire collective (TIAC)</b>	Survenue de symptômes cliniques variés au décours d'un repas, touchant au moins 02 personnes ayant partagé le même repas.
<b>Infections Sexuellement Transmissibles (IST) :</b>	Tout <b>homme</b> présentant un ulcère de la verge, du scrotum ou du rectum, avec ou sans adénopathie et ou écoulement génital inguinal, ou toute <b>femme</b> présentant un ulcère vulvovaginal, du ou du rectum, avec ou sans leucorrhées pathologiques ou d'adénopathie inguinale.
<b>Lèpre</b>	Personne présentant au moins l'un des trois signes essentiels de la lèpre : lésion cutanée hypo-pigmentée ou rougeâtre avec perte ou diminution de la sensibilité cutanée, épaissement du nerf périphérique.
<b>Malnutrition modéré chez les moins de 5 ans</b>	Tout enfant âgé de moins de 5 ans se trouvant dans la Bande jaune
<b>Malnutrition sévère chez les moins de 5 ans</b>	Tout enfant âgé de moins de 5 ans se trouvant dans la Bande rouge
<b>Paludisme confirmé</b>	Tout cas de fièvre ou antécédent de fièvre ( $T \geq 37,5^{\circ}\text{C}$ ) + TDR palu positif
<b>Paralysie Flasque Aiguë</b>	Un syndrome caractérisé par une paralysie (faiblesse, diminution ou perte de mouvement) qui est flasque (perte de tonus musculaire, membre mou ou flaccide, non spastique) et aiguë (début soudain). Paralysie d'un ou de plusieurs membres survenant subitement chez un enfant âgé de moins de 15 ans ou tout cas diagnostiqué comme tel par le clinicien.
<b>Suspicion cas de rage humaine</b>	Toute personne ayant été mordue ou léchée par un animal à sang chaud domestique ou sauvage, présentant un gêne respiratoire avec spasme hydrophobique ou aérophobie ou paralysie (antécédent de prurit ou de paresthésies/fourmillement au niveau du site de la morsure)
<b>Suspicion cas d'arbovirose</b>	Fièvre + au moins 02 des signes suivants : céphalées, myalgie, arthralgie, éruption cutanée, douleurs retro orbitaire, manifestations hémorragiques
<b>Suspicion cas de méningite</b>	Brusque accès de fièvre avec raideur de la nuque, conscience altérée ou autres syndromes méningés
<b>Suspicion cas de rougeole</b>	Toute personne présentant une éruption cutanée maculo-papuleuse généralisée avec de la fièvre, plus un des éléments suivants: toux ou coryza (nez qui coule) ou conjonctivite (yeux rouges)

<b>Suspicion cas de peste</b>	Toute personne présentant une forte fièvre d'apparition brutale, accompagnée de frissons, céphalées, malaise important, prostration et gonflement très douloureux des ganglions lymphatiques, ou toux avec crachats teintés de sang, douleurs thoraciques, et difficulté à respirer.
<b>Bandelette peste positif</b>	Résultat TDR peste effectué s'affiche positif
<b>Peste bubonique</b>	Fièvre d'apparition soudaine (39-40°C) + présence de bubons (adénopathie douloureuse de siège inguinal ou crural, parfois axillaire ou cervical ou maxillaire sans porte d'entrée
<b>Peste pulmonaire</b>	Fièvre d'apparition soudaine (39-40°C) avec une toux, douleurs thoraciques/gêne respiratoire et des crachats sanguinolents
<b>Tétanos néonatal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tout nouveau-né qui tète et pleure normalement au cours des 2 premiers jours de la vie, mais qui perd cette capacité entre le 3<sup>ème</sup> et le 28<sup>ème</sup> jour et présente des raideurs et des spasmes.</li> </ul> <p><b>OU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tout décès néonatal entre le 3<sup>ème</sup> et le 28<sup>ème</sup> jour de la vie pour lequel la cause est inconnue.</li> </ul>
<b>Toux chronique suspect de Tuberculose</b>	Toute personne toussant depuis au moins 03 semaines
<b>Décès maternel</b>	Décès d'une femme survenu au cours de la grossesse ou dans un délai de 42 jours après son terme, quelle qu'en soit la durée ou la localisation, pour une cause quelconque déterminée ou aggravée par la grossesse ou sa prise en charge, mais ni accidentelle, ni fortuite.
<b>Décès néonatal</b>	Tout enfant né vivant mais décédé entre la naissance et le 28 <sup>e</sup> jour de vie
<b>Autres maladies d'importance en santé publique</b>	Toutes autres maladies que cités dans ci- dessus : ex présence d'ascaris dans les selles ,teigne ,hématurie...

**Synthèse du nombre de la population ( première semaine du mois de Janvier)**

	0 – 28 jours	1 – 11 mois	1– 4 ans	5 – 9 ans	10 -14 ans	15 – 24 ans	25 – 49 ans	50 – 59 ans	60 ans et plus	TOTAL
Sexe Masculin										
Sexe Féminin										

**Renseignements concernant le Chef de Centre de Santé et sa circonscription :**Nom et Prénom : 1<sup>er</sup> responsable : \_\_\_\_\_Nom et Prénom : 2<sup>eme</sup> responsable : \_\_\_\_\_

Num téléphone : 03 |\_\_| . |\_\_|\_\_| . |\_\_|\_\_|\_\_| . |\_\_|\_\_|

Les Fokontany desservis par le CSB :

1- \_\_\_\_\_ 2- \_\_\_\_\_ 3- \_\_\_\_\_

Distance |\_\_|\_\_|\_\_| km Distance |\_\_|\_\_|\_\_| km Distance |\_\_|\_\_|\_\_| km

4- \_\_\_\_\_ 5- \_\_\_\_\_ 6- \_\_\_\_\_

Distance |\_\_|\_\_|\_\_| km Distance |\_\_|\_\_|\_\_| km Distance |\_\_|\_\_|\_\_| km

7- \_\_\_\_\_ 8- \_\_\_\_\_ 9- \_\_\_\_\_

Distance |\_\_|\_\_|\_\_| km Distance |\_\_|\_\_|\_\_| km Distance |\_\_|\_\_|\_\_| km

10- \_\_\_\_\_ 11- \_\_\_\_\_ 12- \_\_\_\_\_

Distance |\_\_|\_\_|\_\_| km Distance |\_\_|\_\_|\_\_| km Distance |\_\_|\_\_|\_\_| km

13- \_\_\_\_\_ 14- \_\_\_\_\_ 15- \_\_\_\_\_

Distance |\_\_|\_\_|\_\_| km Distance |\_\_|\_\_|\_\_| km Distance |\_\_|\_\_|\_\_| km

16- \_\_\_\_\_ 17- \_\_\_\_\_ 18- \_\_\_\_\_

Distance |\_\_|\_\_|\_\_| km Distance |\_\_|\_\_|\_\_| km Distance |\_\_|\_\_|\_\_| km

Nom du district \_\_\_\_\_

District (CODE) : |\_\_|\_\_|\_\_|

**IDENTIFIANT UNIQUE DU CHEF DE CENTRE DE SANTE: \_\_\_\_\_ (à ne pas remplir)**



(À remplir par l'Agent de santé et à envoyer par SMS)

Centre de santé: \_\_\_\_\_

Nom de l'Agent : \_\_\_\_\_

Date d'envoi du SMS: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Description du problème de santé : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Diagnostic suspecté : \_\_\_\_\_

Nombre de cas et de décès :

Nombre de cas connus: |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|      Nombre de décès connus: |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|

Lieux et taille de la population touchés :

Hameau: \_\_\_\_\_ Taille de la population : \_\_\_\_\_

Fokontany: \_\_\_\_\_ Taille de la population : \_\_\_\_\_

Description de la situation épidémiologique :

Date et heure d'apparition du 1er cas : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ à \_\_\_\_\_ heure \_\_\_\_\_ minute

Date et heure d'apparition du 1er décès : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ à \_\_\_\_\_ heure \_\_\_\_\_ minute

Mesures prises sur terrain :

\_\_\_\_\_

Appui demandé aux niveaux supérieurs :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_